Veuillez signaler les effets indésirables
**Pour la Belgique:** au Centre Belge de Pharmacovigilance pour les médicaments à usage humain(CBPH) de l'Agence Fédérale des Médicaments selon la procédure décrite sur le site http://www.fagg-afmps.be ou directement à GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. au numéro +32 10 858500.

**Pour le Luxembourg**: au Ministère de la Santé du Grand-Duché de Luxembourg (Division de la Pharmacie et des Médicaments au numéro de fax +35 2 24795615 ou par courrier postal) ou au Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine (numéro de fax +33 3 83 32 33 44 ou crpv@chu-nancy.fr) ou à GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. au numéro +32 10 858500.

Dec 2013 • BE/DEV/0016/13
E.R. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a.
Site Apollo - Avenue Pascal 2-4-6 - 1300 Wavre

# Aérosol-doseur - le Puff

## Mode d'emploi

Doit d'être fourni en même temps que la prescription pour l'aérosol-doseur

# Aérosol-doseur

## 1. TESTEZ L'INHALATEUR

1. Retirez le capuchon de l'embout buccal en tenant le dispositif fermement en main. Pressez doucement les côtés du capuchon avec l'index et le pouce et retirez-le.
2. Agitez bien l'appareil, appuyez sur la cartouche pour libérer des bouffées dans l'air jusqu'à ce que le compteur indique 120.

## 2. PREPAREZ L'INHALATEUR AVANT UTILISATION

Retirez le capuchon de l'embout buccal, agitez le dispositif 4 à 5 fois. Tenez l'appareil bien à la verticale en plaçant le pouce à la base, sous l'embout buccal.

## 3. INHALEZ

Maintenez l'embout buccal loin de la bouche. Expirez aussi profondément que possible (pas dans l'appareil). Portez l'embout buccal à la bouche et serrez-le entre les lèvres. Inspirez par la bouche. Juste après avoir commencé à inspirer, appuyez fermement le haut de l'appareil vers le bas pour libérer une bouffée du médicament, tout en inspirant régulièrement et profondément. Retenez votre respiration pendant 5 à 10 secondes, expirez lentement. Attendez environ 30 secondes entre chaque bouffée si vous devez prendre une deuxième inhalation.

## 4. REFERMEZ L'INHALATEUR

Après utilisation, remettez toujours immédiatement le capuchon en place pour protéger l'embout buccal de la poussière.